

Doporučené postupy prevence nádorových onemocnění zohledňujících nosičství dědičných patogenních variant nádorových predispozičních genů verze 4.2024

Pracovní skupina onkogenetiky Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP

MLH1 rizika:

V případě genu **MLH1** se jedná o **vysoce penetrantní** nádorový predispoziční gen.

Pro nosiče jedné zárodečné mutace v genu MLH1 je riziko onemocnění nádorem ve srovnání s běžnou populací 10–15× vyšší pro karcinom tlustého střeva a konečníku, 5–7× vyšší pro karcinom žaludku, 11–14× vyšší pro karcinom těla děložního a 3–15× vyšší pro karcinom vaječníků. Těmto hodnotám odpovídá pravděpodobnost celoživotního rizika vzniku karcinomu tlustého střeva a konečníku 46–61 %, karcinomu žaludku 5–7 %, karcinomu těla děložního 34–54 % a karcinomu vaječníků 4–20 %. Je popsáno také zvýšené riziko vzniku zhoubných nádorů kalichopánvičkového systému ledvin a močového měchýře (0,2–7 %), tenkého střeva (0,4–11 %), slinivky břišní (6,2 %) a žlučových cest a mozku.

Pozn: Dvě zárodečné mutace v genu MLH1 (nefunkční obě alely; není případ testované osoby) jsou příčinou velmi vzácného autozomálně recessivního syndromu CMMRD (konstitučního syndromu deficiency mismatch repair mechanismů), u kterého je popsáno vysoké riziko vzniku nádorových onemocnění v dětském věku.

Je doporučeno prediktivní testování zletilých příbuzných. U dětí je testování možné pouze při rodinném výskytu nádoru v dětském nebo hraničně dospělém věku. V případě plánování reprodukce není rutinně indikováno prekonceptní vyšetření partnera/partnerky. Prekonceptní genetická konzultace a cílené preimplantační genetické testování jsou možné.

MLH1 doporučení žena:

Výkon/vyšetření	Četnost	Časování
Prevence karcinomu kolorekta		
- primární: kyselina acetylsalicylová 500-600 mg/d	denně po dobu dvou let	kdykoliv [#]
- sekundární: kolonoskopie	1× za 1–3 roky dle nálezu	>20–25* let

Prevence karcinomu endometria a ovaria

- primární: profylaktická HYE profylaktická salpingooforektomie + HYE (pokud již nebyla dříve) se SEE-FIM ⁺⁺ s možností následné HRT do období přirozené menopauzy (pokud nemá žena karcinom prsu v OA) chemoprevence (COC, gestageny)	optimálně ve věku lze uvážit	po reprodukci 40*–50 let po reprodukci do HYE + RRSO
- sekundární: konziliární onkogynekologické vyšetření + edukace vyšetření OG včetně TVUZ konziliární onkogynekologické vyšetření včetně UZ + CA-125 a biopsie děložní sliznice (do HYE)	1× 1× ročně 1× za 1–2 roky (do HYE + RRSO)	vstupně >18 let >35* let

Prevence ostatních nádorů

samovyšetření prsů MMG / UZ prsů a axil UZ břicha moč CH + S (hematurie) gastroduodenoskopie (vstupně s detekcí infekce <i>H. pylori</i>) EUS nebo MR slinivky břišní	1× měsíčně 1× ročně střídat 1× za dva roky 1× ročně 1× za 3–5 let při karcinomu žaludku v RA	>18 let >40* let při karcinomu prsu v RA ^{##} >35* let >40–45* let >30–35* let
další vyšetření screening další nádorů	1× ročně při karcinomu pankreatu v RA dle výskytu nádorů v RA dle běžných standardů	> 50* let

Pozn.: Pokud není specifikováno, jedná se o prevenci sekundární určenou k včasnému záchytu případně vzniklých nádorů. Výskyt karcinomu v RA zohledňuje příbuzné prvního a druhého stupně.

dle studie CAPP2 denní dávka kyseliny acetylsalicylové 600 mg/den po dobu nejméně 2 let významně snižuje pravděpodobnost výskytu karcinomu tlustého střeva a konečníku

* případně dříve (5–10 let před nejčasnějším výskytem daného onemocnění v rodině)

++ před RRSO denzitometrie (dále dle nálezu) a kontrola lipidového spektra (po RRSO kontroly pravidelně) cestou PL

v případě vysokého empirického rizika vzniku ca prsu vyplývajícího z rodinné anamnézy upravit doporučení primární/sekundární prevence dle tohoto rizika

Seznam zkratek: COC – kombinovaná perorální kontracepce; EUS – endosonografie; HRT – hormonální substituční terapie; HYE – hysterektomie; MMG – mamografie; moč CH + S – moč chemicky + sediment; MR – magnetická rezonance; OA – osobní anamnéza; OG – obvodní (registrující) gynekolog; PL – praktický lékař; RA – rodinná anamnéza; RRSO – riziko redukující (profylaktická) salpingooforektomie; SE – salpingektomie; SEE-FIM – Sectioning and Extensively Examining the FIMbriated End protokol patologického vyšetření preparátu; TVUZ – transvaginální ultrazvuk; UZ – ultrazvuk

MLH1 doporučení muž:

Výkon/vyšetření	Četnost	Časování
Prevence karcinomu kolorekta		
-primární kyselina acetylsalicylová 500–600 mg/d	denně po dobu dvou let	kdykoliv [#]
-sekundární kolonoskopie	1× za 1–3 roky dle nálezu	>20–25* let
Prevence ostatních nádorů		
UZ břicha	1× za dva roky	>35* let
urologické vyšetření + PSA, moč CH + S (hematurie)	1× ročně	>40–45* let
gastroduodenoskopie (vstupně s detekcí infekce <i>H. pylori</i>)	1× za 3–5 let při výskytu karcinomu žaludku či duodena v RA	>30–35* let
EUS nebo MR slinivky břišní	1× ročně při karcinomu pankreatu v RA	>50* let
další vyšetření	dle výskytu nádorů v RA	
screening další nádorů	dle běžných standardů	

Pozn.: Pokud není specifikováno, jedná se o prevenci sekundární určenou k včasnému záchytu případně vzniklých nádorů. Výskyt karcinomu v RA zohledňuje příbuzné prvního a druhého stupně.

dle studie CAPP2 denní dávka kyseliny acetylsalicylové 600 mg/den po dobu nejméně 2 let významně snižuje pravděpodobnost výskytu karcinomu tlustého střeva a konečníku

* případně dříve (5–10 let před nejčasnějším výskytem daného onemocnění v rodině)

Seznam zkratek: EUS – endosonografie; moč CH + S – moč chemicky + sediment; MR – magnetická rezonance; PSA – prostatický specifický antigen; RA – rodinná anamnéza; UZ – ultrazvuk.

Terapeutické konsekvence (s ohledem na rychlý vývoj je třeba v případě léčby konzultovat postup s ošetřujícím onkologem)

U pacientů s karcinomem rekta stadií I–III zahajovat léčbu imunoterapií a zvážit neprovedení operace (pro její zbytečnost).

Ve stadiu II kolorektálního karcinomu s mikrosatelitovou instabilitou není po operaci indikována adjuvantní chemoterapie, a to ani v případě přítomnosti jiných rizikových faktorů.

U žen zvážit provedení profylaktické HYE+SE/RRSO (dle věku) v situaci, kdy se plánuje operace kolorektálního karcinomu.

Obecně u kterékoli malignity v případě potřeby systémové léčby u lokoregionálně pokročilých stadií upřednostnit režimy s imunoterapií.
--

V případě zjištění metastatického onemocnění kterékoli malignity vždy uvažovat o prvoliniovém podání imunoterapie.
--

Především u mladších pacientů s karcinomem zvážit provedení totální kolektomie namísto hemikolektomie.
--

Literatura:

Novotný J. et al., Doporučené postupy klinické péče o nosiče zárodečných mutací v genech MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 a velkých delecí EPCAM predisponujících ke vzniku Lynchova syndromu (4.2024). Klin Onkol 2024; 37(5). doi: 10.48095/cko20241

Sessa, C. et al., Risk reduction and screening of cancer in hereditary breast-ovarian cancer syndromes: ESMO Clinical Practice Guideline. Ann Oncol, 2023. 34(1): p. 33–47.

Burn J. et al. Long-term effect of aspirin on cancer risk in carriers of hereditary colorectal cancer: an analysis from the CAPP2 randomised controlled trial. Lancet. 2011; 378: 2081–2087.

Lynch Syndrome. NCCN Guidelines Version 1.2024

Foretová L., Macháčková E., Gaillyová R. a kolektiv, Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi, Grada 2022, ISBN: 978-80-271-1293-7